



## 頭を打った子供さんのご家族の方へ

子供さんは現在のところ入院の必要はありません。しかし万が一という事もありますので今日一日（今夜一晩）は、しっかり様子を観察し、次のことに注意して頂くようお願いいたします。おかしいと思ったとき心配になった時は、まずお電話でお問い合わせ下さい。

### ① 機嫌が悪い

- ・ 機嫌が良く、笑ったり遊んだりしている時は、心配ありません。しかし、むずかかって機嫌が悪い、普段と違った泣き方をする、特に手足をあまり動かさずぐったりしているように見える時にはご連絡下さい。

### ② 意識の低下

- ・ 眠っている時は寝返りや手足の動きにご注意下さい。特に左右どちらかの手足の動きが明らかに弱いような時や起こして起きないような時は、ご注意下さい。また、視線が合わない眼の位置がおかしいなども要注意の症状です。
- \* <意識の観察は、頭を打った後症状がない場合でも24時間は必要です。>

### ③ 繰り返し吐く場合

- ・ 小児は、頭を打つとあまり重症でなくても吐くことがあります。意識がはっきりして機嫌が悪くなければ1～2回の嘔吐は心配ありません。安静にさせ注意して観察して下さい。乳幼児は脱水に陥りやすいので湯冷ましや番茶にて、水分の補給を行って下さい。
- ・ また安静の状態でも数回吐いた後、ぐったりしている状態の時はご連絡ください。

### ④ けいれん発作のあった場合

- ・ 観察中けいれん（ひきつけ）発作が起こった時は、あわてる必要はありませんが、（まもなくおさまります）救急車にてご来院くださるようお願い致します。

### ⑤ 頭が痛い

- ・ 頭を打ってから48時間以上立ってからの小児の「頭が痛い」という訴えは①～④のような症状がなければ、あまり心配する必要はありません。その他判らない事があったり、ご心配なときには遠慮なさらずにご連絡ください。

尚、17時以降は救急室にて対応いたします。

