

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					
03-041	乳癌	キイトルーダ +AC療法 (術前)	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																										
			ドキソルピシン	60 mg/m ²	D1		●																							終																							
			エンドキサン	600 mg/m ²	D1		●																								終																						
			(p.o) アブレヒタント		D1-D3		●	●	●																						終																						
			(p.o) オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																					終																						
03-042	乳癌	キイトルーダ療法 (術後)	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																					終																									
			デキサート	9.9 mg	D1		●																								終																						
03-043	乳癌	フェスゴ皮下注射法	フェスゴ	初回：IN 2回目以降：MA	D1	3週毎	●																					終																									
03-044	乳癌	フェスゴ皮下注 +DOC療法	フェスゴ	初回：IN 2回目以降：MA	D1	3週毎	●																						終																								
			ドセタキセル	75 mg/m ²	D1		●																								終																						
			(p.o) デカドロン	8 mg	D1-D3		●	●	●																							終																					
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1		●																									終																					

2024年12月 更新

・高度催吐リスクレジメンにオランザピン追加 (ドキソルピシン、エビルピシン使用レジメン)